

*Brindemos juntos  
una mejor calidad de vida*

**NUTRICIÓN**  
• PACIENTES PALIATIVOS •



**NUTRICIÓN  
PARENTERAL**



**NUTRICIÓN  
PARENTERAL  
INTERMITENTE O  
CICLADA**



**CATÉTER DE INSERCIÓN  
PERIFÉRICA (PICC) O  
CATÉTER VENOSO  
CENTRAL (CVC)**

### ***NUTRICIÓN PARENTERAL***

La nutrición parenteral (NP) consiste en la provisión de nutrientes, líquidos y electrolitos mediante su infusión a una vía venosa a través de catéteres específicos. Su duración dependerá de la situación fisiopatológica del paciente, pudiendo indicarse de forma transitoria o indefinida.

#### ***NUTRICIÓN PARENTERAL INTERMITENTE O CICLADA***

Se administra en un periodo de tiempo determinado, generalmente durante la noche, en infusiones entre 12 a 22 horas y se indica cuando su administración será prolongada a 20 días, debido a que se puede predisponer a un estado de hiperinsulinismo.

#### ***CATÉTER DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (PICC) O CATÉTER VENOSO CENTRAL (CVC)***

Es un dispositivo que permite el acceso al torrente sanguíneo a nivel central con el fin de administrar medicamentos, fluidoterapia, nutrición parenteral total o para monitorización hemodinámica o hemodiálisis. El tipo de acceso venoso central dependerá entre otras cosas de la indicación y de la anatomía del paciente.



## PRECAUCIONES

- ✓ Evite manipular la bomba de infusión, solo en los casos autorizados.
- ✓ No descubra bolsa, no saque del empaque, recuerde que la bolsa que cubre la nutrición actúa de manera protectora.
- ✓ Evite mover el catéter durante la administración de la nutrición, ni manipular.
- ✓ Recuerde cubrir el catéter en caso de posible exposición a la humedad.
- ✓ Mantenga la bolsa de NPT alejada de toda fuente de calor (calefacción, luz solar), ya que esto puede afectar la estabilidad de la mezcla.
- ✓ Recuerde que al llegar la nutrición debe ser refrigerada inmediatamente, en la parte baja de la nevera, NUNCA en el congelador.
- ✓ Recuerde sacar la nutrición 30 MINUTOS antes de la aplicación, para tener listo el producto cuando llegue el personal para la administración.

## COMO ACTUAR EN LAS DIFERENTES SITUACIONES O EVENTUALIDADES, DEL PROCESO DE NUTRICION PARENTERAL



### SI PRESENTA DESCONEXIÓN ENTRE EL CATÉTER Y EL EQUIPO

Como ya se conoce las partes y la funcionalidad del catéter, inducción dada al ingreso, pince inmediatamente para evitar fugas del dispositivo, siguiente a esto, la persona que va a manipular el catéter para cubrirlo, debe realizarse lavado de manos, coger una gasa estéril del paquete de emergencia que se deja en domicilio, tome el catéter desde las vías, no del sitio de inserción y cubrir por completo, termine sellándolo con Micropore ajustando la gasa al dispositivo y reporte inmediatamente a la línea de atención.



### SI PRESENTA DESCONEXIÓN ENTRE EL CATÉTER Y EL EQUIPO

Si durante la administración de la nutrición observa sangrado por sitio de inserción, o fuga de la nutrición por sitio de inserción, hacer lavado de manos de la persona que va a manipular el catéter, pince las vías, apague inmediatamente la bomba de infusión, como le fue instruido en la inducción, y proceda a realizar llamado a la línea de atención.

#### **NOTA IMPORTANTE:**

Si el sangrado es abundante y no puede establecer comunicación con la línea de atención, tome gasas del kit de emergencia proceda a ponerlas sobre el sitio de inserción y fije con Micropore y dirijase a su lugar de atención de urgencias más cercano.



### ***SI PRESENTA SEÑALES DE ALARMA EN BOMBA DE INFUSION***

Si durante la infusión se presenta ruido de alarma en bomba que no cesa, proceda como se indicó en inducción, buscar el botón de encendido y apagado del sistema, proceda a apagar el equipo, sin desconectar el catéter del circuito de administración y reporte inmediatamente a línea de atención.



### ***NOVEDADES DURANTE LA ADMINISTRACION DE LA NUTRICION***

Si presenta alguna molestia alrededor del catéter o si presenta signos de infección como fiebre, hinchazón alrededor del catéter, zona del catéter roja o caliente, dolor o ardor a la manipulación del catéter, reporte inmediatamente a línea de atención.



### ***NOVEDADES DURANTE LA ADMINISTRACION DE LA NUTRICION***

En los casos que no llegue la nutrición parenteral en el horario estipulado o habitual, por favor comunicarse a la línea de atención, para reporte al personal que lo atiende con el fin, de reprogramar horario y solucionar la situación.



### ***SI AL RECIBIR NUTRICION OBSERVA CAMBIOS FISICOS DEL PRODUCTO***

Si al recibir la nutrición encuentra grumos o consistencia diferente a líquida en el producto, manchas o cambio en la coloración y bolsa abierta, reporte inmediatamente a línea de atención.



## **DAÑOS BOLSA DE NUTRICIÓN**

Si al recibir la nutrición o al sacar de la nevera observa ruptura o fugas en la bolsa de nutrición, comunicarse a la línea de atención, para tomar decisiones de manejo.



## **REPORTE DE NOVEDADES DURANTE LA ATENCION**


Si usted tiene una observación de la atención o del servicio que le están prestando, con respecto al personal auxiliar de Enfermería que lo atiende o profesional de Enfermería, comuníquese con el área de coordinación de Enfermería teléfono: 3157132543 horarios lunes a viernes: 7:30 am a 5:30 pm y en las noches, sábados y domingos 24 HORAS se debe llamar a la línea de atención.



## **NOVEDADES CON LA RECOLECCION DE RESIDUOS**

cuando evidencie que no han recogido las bolsas de residuos en el tiempo programado, por favor reportar al área de programación de residuos: 3015129924, así mismo, si para el día de recolección tiene una novedad por favor informar para reprogramación.

## **LÍNEAS DE CONTACTO SALUD TREC**

 **LINEA DE ATENCION • HORARIO LAS 24 HORAS: 3007099943**

- **LINEA PARA REPORTE NOVEDADES DURANTE LA ATENCION: 3157132543**
- **LINEA PROGRAMACION RESIDUOS: 3015129924**

*lunes a viernes 7:00 am a 4:30 pm, sábados hasta la 5 pm, y sábados después de la 5 PM a domingo LLAMAR A LA LINEA DE ATENCION.*